



INDICACIONES PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

LABINCO IP-03-04

HECES FECALES:

Forma de recolectar la muestra

- La muestra se obtiene permitiendo que caiga dentro de un recipiente de boca ancha de plástico limpio, seco. Luego trasladarla al frasco de transporte de muestra que compró en la farmacia o solicitó en el laboratorio.
- La muestra no debe de mezclarse con orina, agua o papel higiénico.

Importante:

- Al trasladar la muestra al frasco de transporte, tenga cuidado de seleccionar las partes con mayores mucosidades o sanguinolentas y tener cuidado de que sea una muestra representativa de diferentes sitios.
- Para estudios parasitológicos, es recomendable obtener tres muestras en días alternos ya que muchos parásitos no aparecen en números consistentes diariamente.

Forma de recolectar la muestra para los niños que usan pañales:

- Cubra el pañal con un envoltorio plástico.
- Coloque el envoltorio plástico de forma tal que impida que la orina y las heces se mezclen. Esto proporcionará una mejor muestra.

Tiempo de transporte cuando la muestra es:

- Líquida: 30 minutos
- Suave: 1 hora
- Sólida: Hasta 12 horas

Interferencias:

Los antiácidos, antidiarreicos o laxantes, aceite mineral, antibióticos y medicamentos antiparasitarios, enemas, material que se utiliza para el contraste (líquidos que se toman antes de realizar ciertas radiografías, tomografías computadas u otros estudios de imágenes) ya que todos ellos pueden volver inadecuadas las muestras de heces para la identificación de parásitos. Esperar una semana después de su uso para realizar el examen de heces (consultarlo con su médico).

Actualizado febrero 2022